

## **Nueva indicación de anastrozol para el cáncer de mama**

### **Jano On-line**

13/07/2006 08:05

Diversos países de la Unión Europea han aprobado anastrozol, desarrollado por AstraZéneca como Arimidex, para el tratamiento adyuvante del cáncer de mama inicial en mujeres posmenopáusicas con receptores hormonales positivos que han recibido tamoxifeno adyuvante durante 2 a 3 años, ya que ha demostrado lograr mantener a las pacientes más tiempo libres de enfermedad.

Según varios análisis, cambiar de tamoxifeno a anastrozol puede mejorar de forma significativa la posibilidad de que una mujer viva más tiempo libre de enfermedad, comparándolo a continuar con tamoxifeno.

Este fármaco (de la familia de los inhibidores de la aromatasa) fue aprobado inicialmente en 2002 para el tratamiento adyuvante del cáncer de mama inicial y ahora es el único de este tipo de medicamentos que ha confirmado ser superior a tamoxifeno cuando se utiliza durante el periodo recomendado de cinco años de tratamiento, como se ha demostrado en el Análisis de Tratamiento Completo del estudio ATAC.

Asimismo, es el único inhibidor de la aromatasa con amplios datos de tolerabilidad durante un periodo total de 5 años de tratamiento y tiene un perfil beneficio riesgo establecido en el marco de la adyuvancia.

Hasta la fecha, anastrozol' sólo estaba autorizado para su uso tras cirugía en cáncer de mama, en pacientes de nuevo diagnóstico (tratamiento adyuvante primario). La nueva indicación le convierte en el primer y único inhibidor de la aromatasa aprobado tanto para uso en tratamiento adyuvante desde el inicio como después de 2-3 años de tamoxifeno.